



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost
EF-1002



SLUŽEB A PONÚK
OSTRAVA

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Tento projekt je spolufinancován ESF a OPVK

Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám

Číslo projektu:	CZ.1.07/1.5.00/34.0883
Název projektu:	Rozvoj vzdělanosti
Číslo šablony:	III/2
Datum vytvoření:	7. 1. 2013
Autor:	Ing. Ivana Náplavová
Určeno pro předmět:	První pomoc
Tematická oblast:	Bezvědomí a neodkladná resuscitace, intoxikace
Obor vzdělání:	Masér sportovní a rekondiční 69-41-L/002 1. ročník
Název výukového materiálu:	Kontrolní test varianta A + varianta B
Popis využití:	Ověření znalostí žáků
Čas:	10 minut

Varianta A

1. Při kvalitativní poruše vědomí je
a) vědomí zastřené
b) vědomí obluzené
c) postižený je v bezvědomí
2. Zástavu srdce provází zástava dýchání
a) nikdy
b) někdy ano
c) vždy
3. Co je to synkopa
a) nosní dutina
b) těžké bezvědomí bez reakce na podněty z okolí
c) krátkodobá ztráta vědomí
4. Neprůchodnost dýchacích cest můžezpůsobit
a) tvrdý spánek
b) zapadlý kořen jazyka
c) úraz nohy
5. Gordonův manévr pro uvolnění dýchacích cest se provádí
a) kompresí břicha
b) stlačením žaludku
c) úderem do zad mezi lopatky
6. Za jak dlouhou dobu dochází k trvalému poškození mozku při nedostatku kyslíku
a) za 4 minuty
b) za 5 minut
c) za 8 minut
7. Co je to koma
a) druh obvazu
b) stupeň bezvědomí
c) kost dolní končetiny
8. Při poskytování nepřímé srdeční masáže musí postižený
a) ležet na zádech na měkké podložce
b) ležet na zádech na tvrdé podložce
c) být v polosedě
9. Trojitý manévr tvoří
a) předklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a nahoru a pootevření úst
b) záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a nahoru a pootevření úst
c) záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a nahoru
10. Při nepřímé srdeční masáži se u dospělých stlačuje hrudník o
a) 4-5 cm
b) 3-4 cm
c) 6-7 cm
11. Který orgán je při zástavě oběhu poškozen nejdříve
a) srdce
b) plíce
c) mozek
12. Heimlichův manévr pro uvolnění dýchacích cest se provádí
a) kompresí břicha
b) stlačením žaludku
c) úderem do zad mezi lopatky
13. Umělé dýchání neprovádíme
a) z nosu do úst
b) z úst do úst
c) z úst do nosu a úst
14. Při neodkladné resuscitaci poměr stlačení hrudníku a dýchání je
a) 15:4
b) 10:5
c) 30:2
15. Kdy nemusíme zahájit KPR
a) při náhlé zástavě dýchání a krevního oběhu
b) pokud není spolehlivý důkaz smrti
c) zachránci jsou v ohrožení vlastního života
16. Resuscitační rouška se používá při
a) ošetřování popálenin
b) umělém dýchání
c) nepřímé srdeční masáži
17. Na maximálně jak dlouho můžeme přerušit nepřímou srdeční masáž
a) na 5 vteřin
b) na 10 vteřin
c) je to jedno
18. Při umělém dýchání z úst do úst musíme
a) postiženému pokrčit dolní končetiny
b) uložit postiženého do stabilizované polohy
c) zaklonit hlavu a utěsnit postiženému nosní dírky
19. Postup ABC znamená
a) uvolnit dýchací cesty, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž
b) umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, uvolnit dýchací cesty
c) nepřímá srdeční masáž, uvolnit dýchací cesty, umělé dýchání
20. Mezi příznaky částečné neprůchodnosti dýchacích cest nepatří
a) projevy dýchací tísň v obličeji
b) kýchání, smrkání
c) porucha vědomí

Varianta B

1. Neprůchodnost dýchacích cest může způsobit

- a) zapadlý kořen jazyka
- b) tvrdý spánek
- c) úraz nohy

2. Při neodkladné resuscitaci poměr stlačení hrudníku a dýchání je

- a) 15:4
- b) 30:2
- c) 10:5

3. Při poskytování nepřímé srdeční masáže musí postižený

- a) být v polosedě
- b) ležet na zádech na měkké podložce
- c) ležet na zádech na tvrdé podložce

4. Resuscitační rouška se používá při

- a) nepřímé srdeční masáži
- b) ošetřování popálenin
- c) umělému dýchání

5. Mezi příznaky částečné neprůchodnosti dýchacích cest nepatří

- a) kýchání, smrkání
- b) projevy dýchací tísň v obličeji
- c) porucha vědomí

6. Umělé dýchání neprovádíme

- a) z úst do nosu a úst
- b) z úst do úst
- c) z nosu do úst

7. Při kvalitativní poruše vědomí je

- a) postižený je v bezvědomí
- b) vědomí zastřelené
- c) vědomí obluzené

8. Trojitý manévr tvoří

- a) záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a nahoru a pootevření úst
- b) záklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a nahoru
- c) předklon hlavy, předsunutí dolní čelisti dopředu a nahoru a pootevření úst

9. Při umělému dýchání z úst do úst musíme

- a) uložit postiženého do stabilizované polohy
- b) zaklonit hlavu a utěsnit postiženému nosní dírky
- c) postiženému pokrčit dolní končetiny

10. Co je to synkopa

- a) těžké bezvědomí bez reakce na podněty z okolí
- b) krátkodobá ztráta vědomí
- c) nosní dutina

11. Postup ABC znamená

- a) nepřímá srdeční masáž, uvolnit dýchací cesty, umělé dýchání
- b) umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž, uvolnit dýchací cesty
- c) uvolnit dýchací cesty, umělé dýchání, nepřímá srdeční masáž

12. Zástavu srdce provází zástava dýchání

- a) vždy
- b) nikdy
- c) někdy ano

13. Gordonův manévr pro uvolnění dýchacích cest se provádí

- a) úderem do zad mezi lopatky
- b) stlačením žaludku
- c) kompresí břicha

14. Při nepřímé srdeční masáži se u dospělých stlačuje hrudník o

- a) 3-4 cm
- b) 4-5 cm
- c) 6-7 cm

15. Heimlichův manévr pro uvolnění dýchacích cest se provádí

- a) kompresí břicha
- b) stlačením žaludku
- c) úderem do zad mezi lopatky

16. Co je to koma

- a) kost dolní končetiny
- b) druh obvazu
- c) stupeň bezvědomí

17. Který orgán je při zástavě oběhu poškozen nejdříve

- a) plíce
- b) mozek
- c) srdce

18. Kdy nemusíme zahájit KPR

- a) zachránci jsou v ohrožení vlastního života
- b) při náhlé zástavě dýchání a krevního oběhu
- c) pokud není spolehlivý důkaz smrti

19. Na maximálně jak dlouho můžeme přerušit nepřímou srdeční masáž

- a) na 10 vteřin
- b) na 5 vteřin
- c) je to jedno

20. Za jak dlouhou dobu dochází k trvalému poškození mozku při nedostatku kyslíku

- a) za 8 minut
- b) za 5 minut
- c) za 4 minuty